

序号	商品名	通用名	厂商	疾病种类	适应症限制
1	泰圣奇	阿替利珠单抗	罗氏	肝癌	限用于联合贝伐珠单抗用于治疗既往未接受过系统治疗的不可切除肝细胞癌（HCC）患者。
2	利卡汀	美妥昔单抗	成都华神	肝癌	限用于不能手术切除或术后复发的原发性肝癌，以及不适宜作动脉导管化学栓塞（TACE）或经TACE治疗后无效、复发的晚期肝癌患者。
3	欧狄沃	纳武利尤单抗	百时美施贵宝	肺癌	限用于单药治疗表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性、既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。

4	英飞凡	度伐利尤单抗	阿斯利康	肺癌	限用于在接受铂类药物为基础的化疗同步放疗后未出现疾病进展的不可切除、III期非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的治疗。
5	多泽润	达可替尼	辉瑞	肺癌	限用于表皮生长因子受体 (EGFR) 19号外显子缺失突变或 21号外显子L858R置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的一线治疗。
6	可瑞达	帕博利珠单抗	默沙东	肺癌	限用于1.联合培美曲塞和铂类化疗适用于表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阴性的转移性非鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 的一线治疗; 2.联合卡铂和紫杉醇适用于转移性鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的一线治疗

7	贝美纳	恩沙替尼	贝达	肺癌	限用于此前接受过克唑替尼治疗后进展的或者对克唑替尼不耐受的间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者。
8	福可维	安罗替尼	正大天晴	甲状腺癌	限用于无法手术的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗。
9	爱博新	哌柏西利	辉瑞	乳腺癌	限用于激素受体（HR）阳性、人表皮生长因子受体2（HER2）阴性的局部晚期或转移性乳腺癌，应与芳香化酶抑制剂联合使用作为绝经后女性患者的初始内分泌治疗。
10	贺丽安	奈拉替尼	北海康成	乳腺癌	限用于既往接受曲妥珠单抗辅助治疗的HER2阳性早期乳腺癌患者的强化辅助治疗。
11	爱谱沙	西达本胺	深圳微芯生物	乳腺癌	联合内分泌疗法治疗ER阳性、HER2阴性、经既往内分泌治疗复发/转移的晚期乳腺癌患者。

12	则乐	尼拉帕利	再鼎医药	卵巢癌	限用于晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者对一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。
13	艾瑞颐	氟唑帕利	恒瑞	卵巢癌	限用于既往经过二线及以上化疗的伴有胚系BRCA突变(gBRCAm)的铂敏感复发性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者的治疗。
14	费蒙格	地加瑞克	辉凌制药	前列腺癌	限用于需要雄激素去势治疗的前列腺癌患者。
15	安可坦	恩扎卢胺	阿斯泰来	前列腺癌	限用于治疗非转移性去势抵抗性前列腺癌(CRPC)成年男性患者。
16	安适利	维布妥昔单抗	武田	淋巴瘤	限用于治疗以下CD30阳性淋巴瘤成人患者：复发或难治性系统性间变性大细胞淋巴瘤(sALCL)；复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤(cHL)。

17	宜诺凯	奥布替尼	诺诚健华	淋巴瘤	限用于既往至少接受过一种治疗的套细胞淋巴瘤/小淋巴细胞淋巴瘤患者的治疗。
18	达希纳	尼洛替尼	诺华	白血病	限用于治疗2岁以上儿童慢性髓性白血病。
19	美罗华	利妥昔单抗	罗氏	白血病	限用于与氟达拉滨和环磷酰胺联合治疗先前未经治疗或复发性/难治性慢性淋巴细胞白血病患者。
20	善唯达	盐酸伊达比星	辉瑞	白血病	用于成人急性非淋巴细胞性白血病(ANLL)的一线治疗, 以及复发和难治患者的诱导缓解治疗。
21	艾诺宁	伊达比星	海正药业	白血病	限用于成人未经治疗的急性髓性白血病的诱导缓解和成人复发和难治性急性髓性白血病的诱导缓解。

22	爱普盾	肿瘤电场治疗	再鼎医药	脑瘤	限用于治疗22岁及以上经组织病理学或影像学诊断的复发性幕上胶质脑细胞瘤（GBM）及新诊断的幕上GBM。其中，新诊断的GBM患者中，在手术治疗与放射治疗后，本产品与替莫唑胺联合使用；在复发性GBM患者中本产品为单一治疗方法。其中，爱普盾的报销范围限于爱普盾耗材部分，爱普盾发生器部分由被保险人自行租赁。
23	艾尼妥	替莫唑胺	恒瑞	脑瘤	限用于治疗多形性胶质母细胞瘤或间变性星形细胞瘤。
24	维万心	氯苯唑酸	辉瑞	转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病（ATTR-CM）	用于治疗成人野生型或遗传型转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病（ATTR-CM），以减少心血管死亡及心血管相关住院。

25	维达全	氯苯唑酸葡胺	辉瑞	转甲状腺素蛋白淀粉样变性多发性神经病 (ATTR-PN)	限用于治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性多发性神经病 (ATTR-PN) I期症状性成人患者，以延缓其周围神经功能损害。
26	海乐卫	艾立布林	卫材	乳腺癌	限用于既往接受过至少两种化疗方案的局部晚期或转移性乳腺癌患者。既往的化疗方案应包含一种蒽环类和一种紫杉烷类药物。
27	多美素	多柔比星	石药	卡波氏肉瘤	限用于低 CD4 (<200CD4 淋巴细胞/mm ³) 及有广泛皮肤粘膜内脏疾病的与艾滋病相关的卡波氏肉瘤 (AIDS-KS) 病人。
28	瑞莫杜林	曲前列尼尔	联合制药	肺动脉高压	限用于治疗肺动脉高压 (PAH, WHO分类 1), 以减轻运动引起的相关症状。