

恶性肿瘤自费药目录			
序号	商品名	通用名	适应症
			本品单药适用于治疗表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阴性、既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者。
1	欧狄沃	帕博利珠单抗注射液	本品单药适用于治疗接受含铂方案治疗期间或之后出现疾病进展且肿瘤 PD-L1 表达阳性 (定义为免疫组化 IHC 28-8 染色阳性肿瘤细胞 ≥ 1%) 的复发性或转移性头颈部鳞状细胞癌 (SCCHN) 患者。 本品可用于治疗既往接受过两种或两种以上全身性治疗方案的晚期或复发食管胃食管连接部腺癌患者。
2	立辛	盐酸多柔比星脂质体注射液	本品可用于治疗 CD4+ T 淋巴细胞计数 (mm ³) 及有广泛皮肤黏膜内脏疾病的与艾滋病相关的卡波西肉瘤 (AIDS-KS) 病人。本品可用作一线全身化疗药物，或者用于治疗病情有进展的 AIDS-KS 病人的二线化疗药物。也可用于不能耐受下述两种以上药物联合化疗的病人：长春新碱、博来霉素和多柔比星 (或其他蒽环类抗生素)。
3	多美素	盐酸多柔比星脂质体注射液	本品可用于治疗 CD4+ T 淋巴细胞计数 (mm ³) 及有广泛皮肤黏膜内脏疾病的与艾滋病相关的卡波西肉瘤 (AIDS-KS) 病人。本品可用作一线全身化疗药物，或者用于治疗病情有进展的 AIDS-KS 病人的二线化疗药物。也可用于不能耐受下述两种以上药物联合化疗的病人：长春新碱、博来霉素和多柔比星 (或其他蒽环类抗生素)。
4	乐卫玛	甲磺酸伊马替尼片	本品适用于既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。本品关键研究排除了可接受局部治疗的肝细胞癌患者。此类患者尚无可用的研究数据。
5	拓益	特瑞普利单抗注射液	适用于既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。
6	可瑞达	帕博利珠单抗注射液	帕博利珠单抗适用于经一线治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。 联合铂类化疗和免疫治疗适用于表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阴性的转移性非鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 的一线治疗。
7	爱博新	厄泊西利胶囊	本品适用于激素受体 (HR) 阳性、人表皮生长因子受体 2 (HER2) 阴性的局部晚期或转移性乳腺癌。
8	克艾力	注射用紫杉醇 (白蛋白结合型)	适用于治疗联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后 6 个月内复发的乳腺癌。除非有临床禁忌症，既往化疗中应包括一种蒽环类抗癌药。
9	艾越	注射用紫杉醇 (白蛋白结合型)	适用于治疗联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后 6 个月内复发的乳腺癌。除非有临床禁忌症，既往化疗中应包括一种蒽环类抗癌药。
10	美佳得	氟维司群注射液	限在抗雌激素辅助治疗后或治疗过程中复发的，或在抗雌激素治疗中进展的绝经后 (包括自然绝经和人工绝经) 雌激素受体阳性的局部晚期或转移性乳腺癌。
11	安森珂	阿帕他胺片	本品适用于治疗有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌 (NM-CRPC) 成年患者。 转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌 (mHSPC) 成年患者。
12	费蒙格	注射用醋酸地加瑞克	本品为促性腺激素释放激素 (GnRH) 拮抗剂，适用于需要雄激素去势治疗的前列腺癌患者。
13	达雷妥	注射用达雷妥单抗注射液	本品适用于单药治疗复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者，患者既往接受过包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂的治疗且最后一次治疗时出现疾病进展。
14	多泽润	达可替尼片	用于表皮生长因子受体 (EGFR) L858R 置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的一线治疗。
15	别乐	甲萘磺酸尼拉帕利胶囊	本品适用于铂敏感的复发性和难治性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或者部分缓解后的维持治疗。
16	百泽安	替雷利珠单抗注射液	本品适用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典霍奇金淋巴瘤的治疗。本品适用于 PD-L1 高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗 12 个月内进展的局部晚期或转移性原发灶上皮癌的治疗。
17	英凡	度伐利尤单抗注射液	本品适用于在接受铂类为基础的化疗同步放疗后未出现疾病进展的不可切除、III 期非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的治疗。
18	泰圣奇	阿替利珠单抗注射液	本品与卡铂和依托泊苷联合用于广泛期小细胞肺癌 (ES-SCLC) 患者的一线治疗。
19	赫森莱	注射用恩美曲妥珠单抗	单药适用于接受了紫杉类联合曲妥珠单抗为基础的辅助治疗后仍残存侵袭性灶灶的 HER2 阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。
20	艾瑞卡	注射用卡瑞利珠单抗	本品用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典霍奇金淋巴瘤患者的治疗。
21	海乐卫	甲磺酸艾立布林注射液	本品适用于既往接受过至少两种化疗方案的局部晚期或转移性乳腺癌患者。既往的化疗方案应包含一种蒽环类和一种紫杉类抗癌药。
22	力扑素	注射用恩替卡韦片	本品可用于卵巢癌的一线化疗及以后卵巢转移性癌的治疗。作为一线化疗，本品也可以与顺铂联合应用。
23	豪森斯	甲磺酸氟马替尼片	本品用于治疗费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+ CML)。
24	乐唯达	注射用达那唑片	适用于在利妥昔单抗或含利妥昔单抗方案治疗过程中或者治疗后病情进展的惰性 B 细胞非霍奇金淋巴瘤 (NHL)。
25	曼必妥	西妥昔单抗注射液	本品用于治疗头颈部鳞状细胞癌：与铂类和氟尿嘧啶联合用于一线治疗复发和转移性疾病。

如蒙医保有更新药品目录，则以更新后的药品目录为准。