

| 序号 | 商品名 | 分子名 | 适应症 |
|----|------|----------------|--|
| 1 | 泰圣奇 | 阿替利珠单抗 | 联合化疗用于一线治疗广泛期的小细胞肺癌。 |
| 2 | 阿美乐 | 甲磺酸阿美替尼片 | 限用于既往经表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗进展,且 T790M 突变阳性的局部晚期或转移性肺癌(NSCLC)成人患者。 |
| 3 | 百泽安 | 替雷利珠单抗注射液 | 限用于治疗至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者。 |
| 4 | 拓益 | 特瑞普利单抗 | 适用于既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。 |
| 5 | 豪森昕福 | 甲磺酸氟马替尼片 | 限用于治疗费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期成人患者。 |
| 6 | 安加维 | 地舒单抗 | 用于治疗不可手术切除或者手术切除可能导致严重功能障碍的骨巨细胞瘤,包括成人和骨骼发育成熟(定义为至少1处成熟长骨且体重>45 kg)的青少年患者。 |
| 7 | 艾越 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 适用于治疗联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后6个月内复发的乳腺癌。除非有临床禁忌症,既往化疗中应包括一种蒽环类抗癌药。 |
| 8 | 安森珂 | 阿帕他胺 | 限用于治疗有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌(NM-CRPC)成年患者。 |
| 9 | 艾瑞卡 | 卡瑞利珠单抗 | 限用于治疗至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者。 |
| 10 | 艾尼妥 | 注射用替莫唑胺 | 限用于:1)治疗新诊断的多形性胶质母细胞瘤,开始先与放疗联合治疗,随后作为维持治疗。2)常规治疗后复发或进展的多形性胶质母细胞瘤或间变性星形细胞瘤。 |
| 11 | 乐唯欣 | 注射用盐酸苯达莫司汀 | 限用于在利妥昔单抗或含利妥昔单抗治疗方案治疗过程中或者治疗后病情进展的惰性B细胞非霍奇金淋巴瘤(NHL)。 |
| 12 | 可瑞达 | 帕博利珠单抗 | 适用于经一线治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。 |
| 13 | 乐卫玛 | 仑伐替尼 | 限用于既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。 |
| 14 | 欧狄沃 | 纳武利尤单抗 | 限用于治疗表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性、既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性肺癌(NSCLC)成人患者。 |
| 15 | 多泽润 | 达可替尼 | 单药用于表皮生长因子受体(EGFR)19号外显子缺失突变或21号外显子L858R置换突变的局部晚期或转移性肺癌(NSCLC)患者的一线治疗。 |